Chapitre 0

Eléments d'analyse vectorielle

1-champ scalaire –champ vectoriel:

On considère un trièdre de vecteur unitaires $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et M un point de l'espace, de coordonnées (x, y, z) .

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

- La fonction $f(M)$ est dite scalaire de point ou champ scalaire si:

$$f(M) = f(x, y, z)$$

- Le vecteur $\vec{v}(M)$ est dite fonction vectoriel de point ou champ vectoriel si:

$$\vec{v}(M) = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

2- Gradient d'un champ scalaire :

Le gradient (noté $\overrightarrow{grad}$) est défini a partir d'une fonction scalaire de point et a pour composante suivant $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les dérivées partielles de $f(M)$ par rapport à (x, y, z) respectivement:

$$\overrightarrow{grad}f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$$

3- Divergence d'un champ vectoriel:

Le divergence (noté div) n'est défini qu'à partir d'une fonction vectoriel $\vec{A}$ (M) de point et donne une fonction scalaire de point définie en coordonnées cartésiennes par:

$$div\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

4- Rotationnel d'un champ vectoriel:

Le rotationnel (noté $\overrightarrow{rot}$) d'un champ vectoriel donne une fonction de point définie en coordonnées cartésiennes par:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{v}) = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\vec{i} - \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial z}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\vec{k}$$

5- Laplacien scalaire :

Le laplacien scalaire d'une fonction scalaire de point (noté lap ou Δ) est par définition :

$$lap(f) = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

6- Laplacien vectoriel :

Le laplacien vectoriel (noté $\overrightarrow{\text{lap}}$ ou $\overrightarrow{\Delta}$) d'une champ vectoriel défini par:

$$\overrightarrow{\text{lap}} (\vec{A}) = \Delta \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad div}} \vec{A} - \overrightarrow{\text{rot rot}} \vec{A}$$

-Dans un repère de coordonnées cartésiennes le laplacien vectoriel a les composantes suivantes:

$$\overrightarrow{\text{lap}} (\vec{A}) \begin{cases} \Delta A_x = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \\ \Delta A_y = \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \\ \Delta A_z = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{cases}$$

7- Operateur nabla:

On peut représenter tous les operateur vectoriels précédemment avec l'operateur nabla défini par:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

Les opérateurs vectoriels (*grad, div, rot et laplacien*) s'écrivent avec l'opérateur nabla sous les formes:

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$$

$$\Delta f = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f) = \text{div} \overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \nabla^2 (f)$$

$$\Delta \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{A} - \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} - \vec{\nabla} \wedge \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$$

8- Théorème de Stokes – Théorème de Gauss:

8.1- Circulation d'un champ vectoriel:

On définit la circulation d'un vecteur $\vec{f}$ le long d'un contour (c), par l'intégrale curviligne :

$$C(\vec{F}) = \int_a^b \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

La circulation le long d'un contour fermé est notée:

$$C(\vec{F}) = \oint \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

dl : est un élément de longueur.

8.2- Flux d'un champ vectoriel:

On définit le flux d'un vecteur $\vec{f}$ à travers une surface (s) par l'intégrale double :

$$\Phi(\vec{F}) = \iint \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

ds : est un élément de surface.

Lorsque la surface (s) est fermée, le vecteur $\vec{n}$ est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur.

8.3- Théorème de Stokes:

La circulation d'un vecteur le long d'un contour fermée (c) est égale au flux de son rotationnel à travers cette surface.

$$\oint \vec{F} \cdot \vec{dl} = \iint \text{rot} \vec{F} \cdot \vec{ds}$$

8.4- Théorème de Gauss - Ostrogradski:

Le flux d'un champ vectoriel à travers une surface fermée (S) est égal à l'intégrale de sa divergence dans le volume v , limité par la surface fermée (S) :

$$\oiint \vec{F} \cdot \vec{ds} = \iiint \text{div} \vec{F} dv$$

9- Produit des vecteurs:

9.1- Produit scalaire:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cos(\theta_{AB})$$

Avec $\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$ et $\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

Quelques propriétés :

1. $\vec{A} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{A}\| = \|\vec{A}\|^2$
2. $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$ (Le produit scalaire est commutatif)
3. $(\lambda \vec{A}) \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot (\lambda \vec{B}) = \lambda (\vec{A} \cdot \vec{B})$
4. $\vec{C} \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{C} \cdot \vec{A} + \vec{C} \cdot \vec{B}$
5. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ Si et seulement si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux : $\vec{A} \perp \vec{B}$

9.3- Produit vectoriel:

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = A \cdot B \cdot \sin(A, B).$$

Quelques propriétés :

1. $\vec{A} \wedge \vec{B} = -\vec{B} \wedge \vec{A}$
2. $\vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \vec{C}$
3. $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \cdot \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{C}$
4. $\vec{A} \wedge \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \vec{A} = \vec{0}, \vec{B} = \vec{0}$ ou bien $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires.

10- Relations importantes:

$$\overrightarrow{\text{rot grad } f} = \vec{0}$$

$$\text{div } \overrightarrow{\text{rot } \vec{F}} = 0$$

$$\text{div}(\vec{F} \wedge \vec{K}) = \overrightarrow{\text{K rot } \vec{F}} - \overrightarrow{\text{F rot } \vec{K}}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(f \cdot \vec{K}) = f \overrightarrow{\text{rot } \vec{K}} + \overrightarrow{\text{grad}}(f \wedge \vec{K})$$

$$\overrightarrow{\text{Rot Rot } \vec{A}} = \overrightarrow{\text{grad div } \vec{A}} - \Delta \vec{A}$$

11- Coordonnées cylindriques:

$$\overrightarrow{\text{grad}}V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{u}_z$$

$$\overrightarrow{\text{div}}\vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial r A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$

$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

11- Coordonnées Sphériques:

$$\overrightarrow{\text{grad}}V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \vec{u}_\phi$$

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial r^2 A_r}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \sin \theta A_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial \sin \theta \cdot A_\phi}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \vec{u}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial r A_\phi}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right)$$

$$\Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 r V}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}$$